

KULLANMA TALİMATI

REFRESH LIQUIGEL %1 göz damlası, jel

Göze damlatılır.

Steril

Etkin madde: Her ml’de 10 mg sodyum karboksimetilselüloz içerir.

Yardımcı maddeler: Oksikloro kompleks (Purite), borik asit, sodyum borat dekahidrat, sodyum klorür, potasyum klorür, kalsiyum klorür dihidrat, magnezyum klorür heksahidrat, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza ve eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

Bu Kullanma Talimatında:

1. **REFRESH LIQUIGEL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **REFRESH LIQUIGEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **REFRESH LIQUIGEL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **REFRESH LIQUIGEL’in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1.REFRESH LIQUIGEL nedir ve ne için kullanılır?

REFRESH LIQUIGEL berrak, renksizle saman sarısı arası renkte, partikül içermeyen kıvamlı (viskoz) bir çözeltilidir. Polistiren kapaklı, 15 ml’lik LDPE (düşük yoğunluklu polietilen) şişe içerisinde sunulmaktadır.

REFRESH LIQUIGEL’in etkisi tamamen mekaniktir. Göz yüzeyinde kayganlaştırıcı ve nemlendirici etkisi bulunmaktadır.

REFRESH LIQUIGEL, göz kuruluğu ve göz yaşı azlığının bulunduğu durumlarda, rüzgar ya da güneşe maruz kalmayla ilişkili göz kuruluğuna bağlı rahatsızlık, yanma ve tahrişte geçici bir düzelme sağlamak için ve tahrişe karşı koruyucu olarak kullanılır.

2. REFRESH LIQUIGEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REFRESH LIQUIGEL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise ve bebeklerle 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

REFRESH LIQUIGEL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Gözde ağrı, görmede değişiklik, kızarıklık ve tahrişin devam etmesi durumunda ya da durum kötüleşirse veya 72 saatten uzun sürerse, ilacın kullanımını kesip doktorunuza başvurunuz. Kıvamlı çözeltilerin rengi değişir ya da bulanıklaşırsa kullanmayınız.

Bir başka göz damlasının birlikte kullanılması durumunda, söz konusu ilaç REFRESH LIQUIGEL damlatılmadan en az 15 dakika önce uygulanmalıdır.

Harici kullanım içindir. Bulaşmayı önlemek için damlalığın ucunu herhangi bir yüzeye değdirmeyiniz. Kullandıktan sonra şişenin kapağını kapatınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

REFRESH LIQUIGEL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

REFRESH LIQUIGEL’in yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Diğer göze uygulanan ilaçlarda olduğu gibi, REFRESH LIQUIGEL damlatıldıktan sonra gözünüzde bulanıklık oluşur ise, araç ya da makine kullanmadan önce görmenizin netleşmesini bekleyiniz.

REFRESH LIQUIGEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

REFRESH LIQUIGEL, uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bir başka göz damlasının birlikte kullanılması durumunda, söz konusu ilaç REFRESH LIQUIGEL damlatılmadan en az 15 dakika önce uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. REFRESH LIQUIGEL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmedikçe, etkilenen göze gerektiğinde veya günde 4 kez 1 ya da 2 damla uygulanır.

Sert, gaz geçirgen ve yumuşak kontakt lensler ile birlikte kullanılabilir.

Açıldıktan sonra 25°C'nin altında saklanmak koşuluyla 60 gün içerisinde kullanılmalıdır. Her kullanımdan sonra kapağı kapatılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:



1. İlacınızı kullanmadan önce ellerinizi yıkayın. Boynunuzu geriye alın ve tavana bakın.
2. Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça çekin.
3. Şişeyi ters çevirin ve tedavi uygulanması gereken her göze birer damla gelecek şekilde sıkın
4. Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun.
Damla gözünüzün içine damlamazsa bir kez daha deneyin.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bebeklerde ve 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Eğer REFRESH LIQUIGEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla REFRESH LIQUIGEL kullandıysanız:

REFRESH LIQUIGEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

REFRESH LIQUIGEL'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

REFRESH LIQUIGEL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

REFRESH LIQUIGEL ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi REFRESH LIQUIGEL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın:	10 hastanın en az 1'inde görülebilir
Yaygın:	100 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişide görülebilir
Yaygın olmayan:	1.000 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişi sayısında görülebilir
Seyrek:	10.000 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişi sayısında görülebilir
Çok seyrek:	10.000 hastanın birinden az kişide görülebilir
Bilinmiyor:	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Çok yaygın:

- Görme bozukluğu
- Gözde akıntı

Yaygın:

- Gözde tahriş, yanma ve rahatsızlık
- Gözde kaşıntı
- Göz kapağında şişme ve kızarıklık

Bilinmiyor:

- Gözde ağrı
- Göz kapağı kenarında kabuklanma ve/veya ilaç kalıntısı

- Gözde yabancı cisim varmış hissi
- Gözde kızarıklık
- Göz alerjisi dahil aşırı duyarlılık

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. REFRESH LIQUIGEL’in Saklanması

REFRESH LIQUIGEL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Açıldıktan sonra 25°C’nin altında saklanmak koşuluyla 60 gün içerisinde kullanılmalıdır.

Her kullanımdan sonra kapağı kapatılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra REFRESH LIQUIGEL’i kullanmayız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

AbbVie Tıbbi İlaçlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ataşehir/İstanbul/Türkiye

Üretim yeri:

Allergan Sales LLC
Waco/Teksas/ABD

Bu kullanma talimatı 15.09.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Bu ilaçla ilgili ayrıntılı ve güncel bilgilere, akıllı telefon/tablet veya bir karekod okuyucu ile karekodu tarayarak ulaşabilirsiniz.